

PROTOKOLLI I IMPLANTIT KOKLEAR

Miratuar me Urdhrin e Ministrit të Shëndetësisë Nr. 258, datë 17.06.2014 “Për miratimin e protokolleve të paketave të shërbimeve që do të financohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor”

Implanti Koklear, ekzaminimet preoperative, interventi ndjekja postoperative

1, FAZA PREOPERATIVE

a. Ekzaminimet Laboratorike dhe Imazherike Preoperative

Lloji i Ekzaminimit
Gjak komplet formulë kh,kk
Urinë komplet
INR dhe Indeksi i Protrombines
Glicemi esëll
Azotemi dhe Kreatinemi
Provat e Heparit
EKG
Ro scope pulmonare

b. Ekzaminimet te tjera dhe Imazherike Preoperatore

Lloji i Ekzaminimit
Otoemisionet akustike
Audiometria tonale (në pacientët mbi 3 vjec)
Tympanograma dhe reflekset stapediene
Potencialet e evokuara ABR
CT- Scan
MRI
Konsulte : ORL
Konsulte Psikologu
Konsulte Audiologu
Konsulte Logopedi

2. FAZA OPERATORE (INTERVENTI)

Kjo faze zgjat nga 2-3 ore dhe gjate saj vendoset pajisja e brendshme e implantit koklear (device)

a) Përbërja e ekipit mjekësor në kryerjen e interventit

Emërtimi
Kirurgu i parë
Kirurgu asistent
Mjeku anestezist
Infermiere instrumentiste

Sanitare
Inxhinier

b) Ekipi i personelit në reanimacion

Emërtimi
Mjeku Anestezist
Infermieri

c) Ekipi i personelit në periudhën postoperatore

Kirurgu (4 ditë x 1 orë ditë)
Infermieri (4 ditë x 1 orë ditë)
Pediatri (4 ditë x 0.5 orë ditë)
Sanitare ½ orë ne ditë (0.5 orë në total)

3. LISTA E BARNAVE DHE MATËRIALEVE MJEKESORE TË SALLËS OPERATORE

Lista e Materialeve	Njesia	Sasia
Fentanyl 10 ml	Ampul ë	0.5
Pancuronium (Pavulon)	Ampul ë	2

Midazolam	Ampul ë	1/5
Sevofluran	Flakon	1/4
Propofol	Ampul ë	1
Neostigmine (Prozerinë)	Ampul ë	5
Atropinë	Ampul	1
Ranital	Ampul	1
Dexamethasone	Ampul	2
Sodium Chloride(Fiziologjike)	Flakon	2
Lidokainë	Flakon	1/2
Adrenalinë	Flakon	1
SistemePerfuzioniEndovenoze		1
Shiringa Sterile 20 ml	Copë	2
Shiringa Sterile 10 ml	Copë	2
Shiringa Sterile 5 ml	Copë	3
Shiringa Sterile 2 ml	Copë	2
Set Aspirimi	Copë	1
Benketol	Ampul	1
Kanjul Endovenoze (vigon) 18G/20G/16G	Copë	1
Lame Bisturie 21	Copë	1
Alkol 96 %	Gram	30
PovidonIodienë (Betadin) cmimi 770 lek/litri	ml	30
Garze Hope 10 x 10 cm	Copë	2

Leukoplast	cm	40
Pambuk (100 lek/100 gram)	Gram	30
Doreza Sterile 7	Copë	3
Doreza Sterile 8	Copë	3
Suturë PGA 2/0	Copë	1
Suturë Silk 3/0	Copë	1
Tub Intubimi Enditakeal	Copë	1
Chlorhexidine Glutamate + Alkol Dezinfektant	ml	30
Zhgut Llastiku	Copë	1
Maska Mbrojtëse	Copë	3
Kateter Aspirimi	Copë	1
Garzë Metër	Meter	0.5
Suturë mendafshi me age prerëse 3.0 ose(4.0)	Copë	1
Suturë Vicryl 3.0 (per shtresën e brendshme)	Copë	1
Suturë Vicryl rapid 3.0(per mbylljen e plagës)	Copë	1
Suturë PDS 2.0 (për fiksimin e implantit në shtratin e tij)	Copë	1
Bioglue 2-4 ml(për fiksimin e electrode array në kavitetin mastoid(1/10 për operacion përdoret (1x84000 leke)	Copë	1
Veshje mikroskopi sterile një përdorimshe	Copë	1
Tub steril silikoni një përdorimshe (me xhel)	Copë	2

Spongostan	Copë	1
Surgicel(Absorbable gelatin hemostaf)5x5cm	Copë	1
Furcë Kirurgjikale me Antiseptik	Copë	6

4, FAZA POSTOPERATORE

a. Faza e hershme postoperatore

Kjo fazë perfshin qëndrimin në reanimacion për një ditë dhe qëndrimin në pavion për 3-5 ditë.

Barna dhe ekzaminime të tjera – Periudha postoperatore

Lloji i Ekzaminimit	Njësia	Sasia
Rocephinë	flakon	6
Radiografi e kokës		1
Vizitë kirurgut(mjekim plages)		

b. Faza e vonshme postoperatore

Kjo fazë perfshin:

- vizitën e kirurgut pas 7-10 ditësh
- kontrollin për aktivizimin e pajisjes pas 4-6 javësh

- Rikontrollin për përshtatjen e pajisjes(mapping) pas 2 javësh
- rikontrolle cdo një, dy apo tre (në varësi të individit) muaj për përshtatjen e pajisjes (mapping) gjatë vitit të parë.
- rikontrolle një herë në vit për vitet në vazhdim.
- Vizita periodike tek logopedisti për të zhvilluar të folurin